



Traumeel[®]s

Comprimidos Sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N° H-729

Medicamento Homeopático
Hecho en Alemania

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Arnica montana D2 15 mg; Calendula officinalis D2 15 mg; Hamamelis virginiana D2 15 mg; Achillea millefolium D3 15 mg; Atropa belladonna D4 75 mg; Aconitum napellus D3 30 mg; Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30 mg; Hepar sulfuris calcareum D8 30 mg; Chamomilla recutita D3 24 mg; Symphytum officinale D8 24 mg; Bellis perennis D2 6 mg; Echinacea angustifolia D2 6 mg; Echinacea purpurea D2 6 mg; Hypericum perforatum D2 3 mg. Como excipientes: lactosa y estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

Indicación: Medicamento útil en el tratamiento del dolor y la inflamación leve a moderada, asociada a traumatismo y otros procesos inflamatorios y degenerativos.


Vía de administración: Sublingual.

Usos: Tratamiento de los síntomas como dolor e inflamación debido a lesiones de diverso tipo (deportes, accidentes), como: esguinces, distorsiones, contusiones, hematomas, fracturas óseas, etc.; procesos degenerativos con inflamaciones y supuraciones asociadas a diferentes órganos y tejidos (por ejemplo, parodontitis, gingivitis, parodontosis); también en el aparato locomotor y ligamentos (tendovaginitis, bursitis, brazo de tenista), artrosis de la cadera, rodilla y pequeñas articulaciones.

Advertencias: En caso de contusiones o lesiones agudas muy dolorosas, o si los síntomas de inflamación y dolor persisten o empeoran, luego de 3 días de tratamiento, deberá consultar al médico o acudir a un servicio de urgencia. Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia. No use dosis mayores a las recomendadas.

-Heel





Contraindicaciones: Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes. No utilizar en caso de enfermedades sistémicas como tuberculosis, leucosis, colagenosis, esclerosis múltiple, pacientes portadores del virus VIH o los que ya han desarrollado SIDA, y en otras enfermedades autoinmunes que requieren otro tipo de tratamiento.

Modo de empleo:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.

Dosis pediátricas:

6-11 años 1 comprimido 2 veces al día

2-5 años 1 comprimido 1 a 2 veces al día

< 2 años 1 comprimido al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y niños mayores de 12 años

1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Dosis Pediátrica Aguda:

6-11 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

2-5 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 6 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

< 2 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 4 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Interacciones con otros medicamentos: Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administra conjuntamente con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Efectos secundarios: Tras su empleo es posible la aparición de irritación de la mucosa bucal o sialorrea (excesiva salivación), si esto ocurre deberá suspender el tratamiento. En casos aislados pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad o alergia. Si se presentan reacciones que podrían ser propias del medicamento y ante cualquier duda consulte a su médico.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Precaución: Este medicamento contiene lactosa.

Condiciones de Almacenamiento: Mantener el frasco bien cerrado, a no más de 30 °C. Cerrar el frasco inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Bibliografía: German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978; Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2° Ed.; Baden-Baden, Aurelia Verlag; 1991.

® = Marca Registrada

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos N° 260, piso 6, Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

